

# Búho real (*Bubo bubo*)

Texto y fotos: Ernesto Junco

**Características. Longitud: 60-71 cm.  
Peso 2.000-3.000 g.  
Nombre asturiano. Curuxón.**

Con el plumaje de color leonado o rojizo, en las partes superiores, profusamente manchado de negro; la garganta, pecho y vientre con grandes rayas longitudinales y fino estriado transversal, sobre un fondo amarillento, las patas emplumadas hasta los dedos; los ojos grandes, de color anaranjado, y el pico negro, este búho es típico habitante de terrenos boscosos y roqueros, aunque también busca lugares más despejados, con bosque bajo y árboles dispersos, siempre que exista algún peñasco o acantilado con cuevas donde refugiarse, pues aunque busque su alimento prácticamente en cualquier tipo de terreno, el refugio para pasar las horas diurnas casi siempre es una covacha en algún peñasco o farallón rocoso.

Ave estrictamente nocturna, sale bien entrada la noche, por lo cual muchas veces se ignora su presencia en un determinado lugar. El dato más revelador de la misma es su voz en las noches invernales, consistente en un grito parecido a algunas notas del carabo, aunque también emite otros sonidos, parecidos a la voz de alarma de un pato, bufidos, etc.

Hacia mediados del invierno, e incluso ante, entran en celo, época en las que se les puede escuchar más a menudo, cuando el macho llama a su compañera. La ubicación del nido es una oquedad o cueva en un acantilado más o menos inaccesible. La puesta puede llegar a estar compuesta hasta de cuatro huevos de color blanco, que incuba la hembra durante unos 35 días. Las fechas del

comienzo de ésta, por lo que se refiere a Asturias, no son muy conocidas; más bien son estimativas por comparación con las de la vertiente sur de la cordillera. Así, se deduce que las puestas tendrán lugar aquí hacia el mes de febrero o marzo. El crecimiento de los pollos es lento, permaneciendo en el nido cerca de dos meses, aunque con algo más de un mes de vida, ya se desplazan andando por los alrededores, si la ubicación del nido lo permite. En esta época ya llaman durante la noche insistentemente a sus padres, pidiéndoles comida.

La alimentación del Búho Real, comprende un amplio espectro de presas de pequeño y mediano tamaño, roedores, como ratas, ratones, ardillas, liebres, lirones, conejos, aves sobre todo córvidos, urracas, cornejas, fochas y gallinetas, crías de grandes mamíferos, como corzos o jabatos son más bien ocasionales, mustelidos, y anfibios como las ranas dependiendo del hábitat local de su territorio. La densidad del búho real en Asturias, es muy baja actualmente y puede que nunca haya sido más alta, ya que puede estar motivada por la escasez de presas adecuadas puesto que, dado el tamaño del pájaro, las exigencias energéticas son relativamente elevadas, y difíciles de cubrir a base de pequeñas presas, como ratones y ranas, lo que no ocurre, por ejemplo. Allí donde abunda el conejo que es en cambio la presa más directamente relacionada con esta especie.

Por último, diremos que el búho real en la raza nocturna más grande de la Península Ibérica, y por consiguiente de Asturias. Pero en cambio la raza, o subespecie que nos ocupa (*Bubo bubo hispanicus*) es la más pequeña de las que habitan en el resto de Europa.



**PARQUE DE LA NATURALEZA**



**LA GRANDERA**



**LA GRANDERA**

**a 2 km. de Cangas de Onís**